

レジメン期間 : 49日 診療科 : 消化器内科/外科

がん種 : 大腸がん

| Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 用法/手技 点滴時間(速度) | Day 1 | Day 8 | Day 15 | Day 22 | Day 29 | Day 36 | Day 43 |
|-----------|---|------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 001 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ハロペトリド静注0.75mg/5mL「タイネ」(アキシ) ポララミン注 5mg/1mL ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン) | 1 V 1 V 1 A 3 A | 点滴注射 30分 | ● | | | | | | |
| 002 注射 | 輸液(自動計算) ◆アービタックス注射液(生食500mL用) | 自動 400 mg/m ² | 点滴注射 120分 | ● | | | | | | |
| 003 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL フラッシュ フラッシュ完了後ルートキープ | 1 V | 点滴注射 60分 | ● | | | | | | |
| 004 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆カンプト点滴静注 | 1 V 150 mg/m ² | 点滴注射 90分 | ● | | | | | | |
| 005 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) 全開 (フラッシュ) | 1 V | 点滴注射 | ● | | | | | | |
| 006 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ハロペトリド静注0.75mg/5mL「タイネ」(アキシ) ポララミン注 5mg/1mL ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン) | 1 V 1 V 1 A 3 A | 点滴注射 30分 | | | ● | | ● | | |
| 007 注射 | 輸液(自動計算) ◆アービタックス注射液 | 自動 250 mg/m ² | 点滴注射 60分 | | | ● | | ● | | |
| 008 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ | 1 V | 点滴注射 5分 | | | ● | | ● | | |
| 009 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆カンプト点滴静注 | 1 V 150 mg/m ² | 点滴注射 90分 | | | ● | | ● | | |
| 010 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) 全開 (フラッシュ) | 1 V | 点滴注射 | | | ● | | ● | | |
| 011 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ポララミン注 5mg/1mL ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン) | 1 V 1 A 2 A | 点滴注射 30分 | | ● | | ● | | ● | ● |
| 012 注射 | 輸液(自動計算) ◆アービタックス注射液 | 自動 250 mg/m ² | 点滴注射 60分 | | ● | | ● | | ● | ● |
| 013 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ | 1 V | 点滴注射 5分 | | ● | | ● | | ● | ● |