

レジメン名 : FOLFIRI+Cetuximab (Cetuximab隔週) (1コース2週間) 大腸癌 レジメンコード : 104-3-1

レジメン期間 : 14日 診療科 : 消化器内科/外科

がん種 : 大腸がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセト静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ポララミン注 5mg/1mL	1 V 1 V 3 A 1 A	中心静脈栄養 (埋込 型・精密持続) 30分	●
002 注射	輸液 (自動計算) ◆アービタックス注射液 (生食500mL用)	自動 500 mg/m ²	中心静脈栄養 (埋込 型・精密持続) 120分	●
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	中心静脈栄養 (埋込 型・精密持続) 5分	●
004 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆カンプト点滴静注 ホリナートと同時	1 V 150 mg/m ²	中心静脈栄養 (埋込 型・精密持続) 2時間	●
005 注射	5%ブドウ糖注 250mL レボホリナート点滴静注 カンプトと同時	1 袋 200 mg/m ²	中心静脈栄養 (埋込 型・精密持続) 2時間	●
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆5-FU注 全開	1 V 400 mg/m ²	中心静脈栄養 (埋込 型・精密持続)	●
007 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	中心静脈栄養 (埋込 型・精密持続)	●
008 注射	輸液 (自動計算) ◆5-FU注 (インフューザーホップ) 46時間持続。クレンジング確認	自動 2400 mg/m ²	腫瘍剤静脈内局所持続 注入 (精密・速度指示 46時間)	●
【レジメンコメント】 インフューザーホップのクレンジングを確認!				