

レジメン名 : FOLFIRI+RAM(2コース目以降) レジメンコード : 244-1-2

レジメン期間 : 14日 診療科 : 消化器内科/外科

がん種 : 大腸がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキソ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ポララミン注 5mg/1mL	1 V 1 V 3 A 1 A	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 30分	●
002 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆サイラムザ注 ※ インラインフィルタ-を使用。2回目以降は30分でも可。	1 V 8 mg/kg	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 30分	●
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続)	●
004 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆カンプト点滴静注 レボホリナートと同時	1 V 150 mg/m <sup>2</sup>	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分	●
005 注射	5%ブドウ糖注 250mL レボホリナート点滴静注用 カンプトと同時	1 袋 200 mg/m <sup>2</sup>	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分	●
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆5-FU注 全開	1 V 400 mg/m <sup>2</sup>	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続)	●
007 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続)	●
008 注射	輸液(自動計算) ◆5-FU注(インフューザ-ポンプ) 46時間持続。クレン確認。	自動 2400 mg/ m <sup>2</sup>	腫瘍剤静脈内局所持続 注入(精密・速度指示 46時間)	●
【レジメンコメント】 インフューザ-ポンプのクレンを確認!				