レジメン名：院外専用】UFT/UZEL+BV(1ｺｰｽ目)(1ｺｰｽ4週間)　大腸癌　レジメンコード：250-1-1
レジメン期間：　28日　　診療科：消化器内科／外科
がん種：大腸がん

Rp	薬品/ｺﾒﾝﾄ	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
001 注射	生理食塩液注　１００ｍＬ（ＰＧ） ライン確保用	１ Ｖ	点滴注射	●																				
002 注射	生理食塩液注　１００ｍＬ（ＰＧ） ◆アバスチン点滴静注用 初回90分	１ Ｖ ５ ｍｇ/kg	点滴注射 90分	●																				
003 注射	大塚生食注　５０ｍＬ（ＰＧ） 全開 ﾌﾗｯｼｭ用	１ Ｖ	点滴注射	●																				
004 注射	生理食塩液注　１００ｍＬ（ＰＧ） ライン確保用	１ Ｖ	点滴注射															●						
005 注射	生理食塩液注　１００ｍＬ（ＰＧ） ◆アバスチン点滴静注用 2回目は60分で可	１ Ｖ ５ ｍｇ/kg	点滴注射 60分															●						
006 注射	大塚生食注　５０ｍＬ（ＰＧ） 全開 ﾌﾗｯｼｭ用	１ Ｖ	点滴注射															●						
007 処方	ユーエフティカプセル 0㎡　～　100ｍｇ 1.17㎡　～　200ｍｇ 朝食の前後1時間を避けて	100 ｍｇ /body	分１	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
008 処方	ユーエフティカプセル 0㎡　～　100ｍｇ 1.5㎡　～　200ｍｇ 昼食の前後1時間を避けて	100 ｍｇ /body	分１	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
009 処方	ユーエフティカプセル 0㎡　～　100ｍｇ 1.83㎡　～　200ｍｇ 夕食の前後1時間を避けて	100 ｍｇ /body	分１	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
010 処方	ユーゼル錠	75 ｍｇ/body	分３：食事の前後１時間を避けて	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□