

レジメン名：mFOLFOXIRI+BV(1コース目)(1コース2週間) 大腸癌 レジメンコード：262-1-1

レジメン期間：14日 診療科：消化器内科/外科

がん種：大腸がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセト静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカドロン)	1 V 1 V 3 A	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 30分	●			
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆アバステン点滴静注用 初回90分	1 V 5 mg/kg	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 90分	●			
003 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆カンプト点滴静注	1 V 150 mg/m ²	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 60分	●			
004 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆エルブラット注射用 ルホリナートと同時	1 袋 85 mg/m ²	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分	●			
005 注射	5%ブドウ糖注 250mL レボホリナート点滴静注用 エルブラットと同時	1 袋 200 mg/m ²	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分	●			
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続)	●			
007 注射	輸液(自動計算) ◆5-FU注(インフューザポンプ) 46時間持続。クレン確認。	自動 2400 mg/ m ²	腫瘍剤静脈内局所持続 注入(精密・速度指示 46時間)	●			
008 前投	[125]アプレタカプセル125mg「サワイ」(イメント) 化学療法開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り	●			
009 前投	[80]アプレタカプセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中	1 C	分1：朝食後約30分		●	●	
010 前投	★[4]デカドロン錠 4mg	2 錠	分2：朝食後約30分		●	●	●
【レジメンコメント】 インフューザポンプのクレンを確認!							