

レジメン名 : FP (DDP+5-FU)+Pembrolizumab (1コ-33週間) レジメンコード : 315-1-1

レジメン期間 : 21日 診療科 : 消化器内科/外科

がん種 : 食道がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
001 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間	●				
002 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間	●				
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) ルート確保	1 V	点滴注射	●				
004 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆キイトルーダ点滴静注 インラインフィルター(0.2~5μm)使用。	1 V 200 mg /body	点滴注射 30分	●				
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイレウ」(アロキ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●				
006 注射	マンニトールS注 300mL	1 瓶	点滴注射 30分	●				
007 注射	生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 80 mg/m ²	点滴注射 2時間	●				
008 注射	生理食塩液注 500mL ◆5-FU注	1 V 800 mg/m ²	点滴注射 24時間	●				
009 注射	生理食塩液注 500mL シスプラチン投与後① 側管別ルートから投与	1 V	点滴注射 2時間	●				
010 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL シスプラチン投与後② 側管別ルートから投与	1 袋	点滴注射 2時間	●				
011 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間		●	●		
012 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間		●	●		
013 注射	生理食塩液注 500mL ◆5-FU注	1 V 800 mg/m ²	点滴注射 24時間		●	●		
014 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン) 側管別ルートから投与	1 V 2 A	点滴注射 30分		●	●		
015 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間				●	●
016 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間				●	●
017 注射	生理食塩液注 500mL ◆5-FU注	1 V 800 mg/m ²	点滴注射 24時間				●	●
018 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン) 側管別ルートから投与	1 V 2 A	点滴注射 30分				●	●
019 前投	[125]アプレタトカセル125mg「サワイ」(イメント) シスプラチン開始1時間前【外来は処置として使	1 C	分1 : 医師の指示通り	●				
020 前投	[80]アプレタトカセル80mg「サワイ」(イメント)	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●		

【レジメンコメント】

投与時の輸液ルート接続方法については関連書類→投与ライン図 参照のこと