

レジメン名：Rituximab単剤(1コース1週間) 非ホジキンリンパ腫 レジメンコード：185-1-1

レジメン期間： 7日 診療科：血液内科・臨床腫瘍科

がん種：非ホジキンリンパ腫

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1
001 注射	ソルデム1 500mL ルート確保	1 袋	点滴注射	●
002 注射	生理食塩液注 500mL ◆リツキサソ注 初回：50mL/hで開始し30分毎に50mL/hずつ UP(MAX400mL/h) ※2回目以降(初回が問題なければ)： 100mL/hで開始し30分毎に100mL/hずつ	1 V 375 mg/m ²	点滴注射	●
003 前投	【200】カロナール錠 200mg リツキサソ投与開始の30分前に服用【外来は処置として使用】	2 錠	分1：医師の指示通り	●
004 前投	★アタラックスPCap 25mg リツキサソ投与開始の30分前に服用【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り	●
【レジメンコメント】 初回：50mL/hで開始し30分毎に50mL/hずつUP(MAX400mL/h)、2回目以降問題なければ：100mL/h 100mL/hずつUP(MAX400mL/h)				