

レジメン名：CHOP(1コース4週間) 非ホジキンリンパ腫 レジメンコード：186-1-2

レジメン期間：21～28日 診療科：血液内科・臨床腫瘍科

がん種：非ホジキンリンパ腫

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
001 注射	ソルデム1 500mL ルート確保	1 袋	点滴注射	●				
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) グラニセトロン静注用 1mg/1mL	1 V 1 A	点滴注射 30分	●				
003 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆アドリアシン注用	1 V 50 mg/m ²	点滴注射 30分	●				
004 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆オンコビン注射用	1 V 1.4 mg/m ²	点滴注射 5分	●				
005 注射	生理食塩液注 500mL ◆注射用エンドキサン	1 V 750 mg/m ²	点滴注射 2時間	●				
006 処方	★プレドニゾロン錠5mgステロイド剤「タケダ」	12 錠/body	分1：朝食後約30分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
007 処方	★プレドニゾロン錠5mgステロイド剤「タケダ」	8 錠/body	分1：昼食後約30分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
008 前投	[125]アプロピタントカプセル125mg「サワイ」(イメント) 化学療法開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り	●				
009 前投	[80]アプロピタントカプセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中	1 C	分1：朝食後約30分		●	●		
010 前投	★[4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2：朝昼食後約30分		●	●	●	