

レジメン名：R-CHOP(1コース4週間) 非ホジキンリンパ腫 レジメンコード：187-1-2

レジメン期間：21～28日 診療科：血液内科・臨床腫瘍科

がん種：非ホジキンリンパ腫

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
001 注射	ソルデム1 500mL ルート確保	1袋	点滴注射	●					
002 注射	生理食塩液注 500mL ◆リツキサシ注 初回：50mL/hで開始し30分毎に50mL/hずつ UP(MAX400mL/h) ※2回目以降(初回が問題なければ)： 100mL/hで開始し30分毎に100mL/hずつ	1V 375mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	●					
003 注射	ソルデム1 500mL ルート確保	1袋	点滴注射		●				
004 注射	生理食塩液注 100mL (PG) グラニセトロン静注用 1mg/1mL	1V 1A	点滴注射 30分		●				
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆アドリアシン注用	1V 50mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 30分		●				
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆オンコビン注射用	1V 1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 5分		●				
007 注射	生理食塩液注 500mL ◆注射用エンドキサン	1V 750mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 2時間		●				
008 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1V	点滴注射		●				
009 前投	【200】カロナール錠 200mg リツキサシ投与30分前	2錠	分1：医師の指示通り	●					
010 前投	★アタラックスPCap 25mg リツキサシ投与30分前	1C	分1：医師の指示通り	●					
011 処方	★プレドニゾン錠5mgステロイド剤「タケタ」	12錠	分1：朝食後約30分		□	□	□	□	□
012 処方	★プレドニゾン錠5mgステロイド剤「タケタ」	8錠	分1：昼食後約30分		□	□	□	□	□
013 前投	[125]アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(イメント) 化学療法開始時【外来は処置として使用】	1C	分1：医師の指示通り		●				
014 前投	[80]アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中	1C	分1：朝食後約30分			●	●		
015 前投	★[4]デカドロン錠 4mg	2錠	分2：朝昼食後約30分			●	●	●	