

レジメン名 : CBDCA+PEM+Pembrolizumab (10-13週間) レジメンコード : 264-1-1

レジメン期間 : 21日

診療科 : 呼吸器内科

がん種 : 免疫療法 (非小細胞肺癌)

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイネ」(アロキソ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカドロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●			
002 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●			
003 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆キイトルーダ点滴静注 ※ インラインフィルタ(0.2~5μm)使用	1 V 200 mg /body	点滴注射 30分	●			
004 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●			
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ペメトレキセド注射用 ★インラインフィルタ-不可★	1 V 500 mg/m ²	点滴注射 10分	●			
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●			
007 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液 ★インラインフィルタ-不可★	1 袋 5 AUC	点滴注射 60分	●			
008 注射	大塚生食注 50mL (PG) 全開 フラッシュ	1 V	点滴注射	●			
009 前投	[125]アパレチンカプセル125mg「サワイ」(イメント) 投開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●			
010 前投	[80]アパレチンカプセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	
011 前投	★ [4] デカドロン錠 4mg 2日目から服用	2 錠	分2 : 朝食後約30分		●	●	●
【レジメンコメント】 本レジメン適用の際に閉塞事例が見られたため、その対応策としてCBDCA・PEMはフィルタ-無の輸液ラインを使用することとする。 パニタニ1g/日7日前～・メコハ-ル2A/回7日前～9週毎、最終投与後22日まで							