

レジメン名 : CBDCA+PEM+Atezolizumab(1コース目)(1コース3週間) レジメンコード : 280-1-1

レジメン期間 : 21日

診療科 : 呼吸器内科

がん種 : 免疫療法(非小細胞肺癌)

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハ°ロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイレ」(アロキソ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●			
002 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●			
003 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆テセントリク注 初回60分、※ インラインフィルタ-(0.22μm以下)使用	1 V 1200 mg /body	点滴注射 60分	●			
004 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●			
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ペメトレキセド注射用	1 V 500 mg/m ²	点滴注射 10分	●			
006 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●			
007 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分	●			
008 注射	大塚生食注 50mL (PG) 全開 フラッシュ	1 V	点滴注射	●			
009 前投	[125]ア°レ°ビ°タ°ンカ°セル125mg「サワイ」(イメト°) ケ°開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●			
010 前投	[80]ア°レ°ビ°タ°ンカ°セル80mg「サワイ」(イメト°) 午前中 2日目から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	
011 前投	★ [4] デカドロン錠 4mg 2日目から服用	2 錠	分2 : 朝食後約30分		●	●	●
【レジメンコメント】 ハ°ン°ビ°タ°ン1g/日ア°リム°点滴7日前～・メチコハ°-ル2A/回ア°リム°点滴7日前～9週毎、最終投与後22日まで							