

レジメン名：患者限定)Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM short hydration(1コース6週間) レジメンコード：299-1-1

レジメン期間：42日

診療科：呼吸器内科

がん種：免疫療法(非小細胞肺癌)

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG)	1 V	点滴注射	●							
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆オプジーボ点滴静注 ※インラインフィルターを使用	1 V 360 mg /body	点滴注射 30分	●							
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) 2回目以降、問題なければフラッシュ可	1 V	点滴注射 30分	●							
004 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆ヤーボイ点滴静注 ※インラインフィルターを使用	1 V 1 mg/kg	点滴注射 30分	●							
005 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●							
006 注射	ソルデム1 500mL ★アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット 【Mg】硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	1 袋 1 筒 1 A	点滴注射 60分	●							
007 注射	大塚生食注 50mL (PG) ハ°ロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイ林」(70キ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 15分	●							
008 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ペメトレキセド注射用	1 V 500 mg/m ²	点滴注射 10分	●							
009 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	点滴注射 30分	●							
010 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 75 mg/m ²	点滴注射 60分	●							
011 注射	ソルデム1 500mL ★アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット	1 袋 1 筒	点滴注射 60分	●							
012 前投	[125]ア°レ°ビ°タ°カ°セル125mg「サ°イ」(イ°メ°ト°) 化学療法開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り	●							
013 前投	[80]ア°レ°ビ°タ°カ°セル80mg「サ°イ」(イ°メ°ト°) 午前中	1 C	分1：朝食後約30分		●	●					
014 前投	★[4]デカドロン錠 4mg 午前中 2日目から服用	2 錠	分2：朝食後約30分		●	●	●				
015 注射	生理食塩液注 100mL (PG)	1 V	点滴注射					●			
016 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆オプジーボ点滴静注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下)	1 V 360 mg /body	点滴注射 30分					●			
017 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射					●			
018 注射	ソルデム1 500mL ★アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット 【Mg】硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	1 袋 1 筒 1 A	点滴注射 60分					●			
019 注射	大塚生食注 50mL (PG) ハ°ロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイ林」(70キ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 15分					●			
020 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ペメトレキセド注射用	1 V 500 mg/m ²	点滴注射 10分					●			
021 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	点滴注射 30分					●			

レジメン名：患者限定)Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM short hydration(1コース6週間) レジメンコード：299-1-1

レジメン期間：42日

診療科：呼吸器内科

がん種：免疫療法（非小細胞肺癌）

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25
022 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 75 mg/m ²	点滴注射 60分					●			
023 注射	ソルデム1 500mL ★アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット	1 袋 1 筒	点滴注射 60分					●			
024 前投	[125]アプレキタントカプセル125mg「サイ」(イメント) 化学療法開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り					●			
025 前投	[80]アプレキタントカプセル80mg「サイ」(イメント) 午前中	1 C	分1：朝食後約30分						●	●	
026 前投	★[4]デカドロン錠 4mg 午前中 2日目から服用	2 錠	分2：朝昼食後約30分						●	●	●