

レジメン名：患者限定)CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab (1コース6週間) レジメンコード：300-1-1

レジメン期間：42日

診療科：呼吸器内科

がん種：免疫療法(非小細胞肺癌)

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ライン確保用	1 V	点滴注射 30分	●							
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆オプジーボ点滴静注 ※インラインフィルターを使用	1 V 360 mg /body	点滴注射 30分	●							
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) 2回目以降、問題なければフラッシュ可	1 V	点滴注射 30分	●							
004 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆ヤーボイ点滴静注 ※インラインフィルターを使用	1 V 1 mg/kg	点滴注射 30分	●							
005 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●							
006 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセトロン静注0.75mg/5mL「タイナ」(アロキソ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカドロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●							
007 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ペメトレキセド注射用	1 V 500 mg/m ²	点滴注射 10分	●							
008 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●							
009 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	点滴注射 60分	●							
010 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●							
011 前投	[125]アプレタントカプセル125mg「サワイ」(イメト) 化学療法開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り	●							
012 前投	[80]アプレタントカプセル80mg「サワイ」(イメト) 午前中 2日目から服用	1 C	分1：朝食後約30分		●	●					
013 前投	★[4]デカドロン錠 4mg	2 錠	分2：朝食後約30分		●	●	●				
014 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ライン確保用	1 V	点滴注射					●			
015 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆オプジーボ点滴静注 ※インラインフィルターを使用すること	1 V 360 mg /body	点滴注射 30分					●			
016 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射					●			
017 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセトロン静注0.75mg/5mL「タイナ」(アロキソ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカドロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分					●			
018 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ペメトレキセド注射用	1 V 500 mg/m ²	点滴注射 10分					●			
019 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射					●			
020 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	点滴注射 60分					●			
021 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射 0分					●			

レジメン名：患者限定)CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab (1コース6週間) レジメンコード：300-1-1

レジメン期間：42日

診療科：呼吸器内科

がん種：免疫療法（非小細胞肺癌）

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25
022 前投	[125]アブリティカブセル125mg「サワイ」(イメント) 化学療法開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り					●			
023 前投	[80]アブリティカブセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1：朝食後約30分						●	●	
024 前投	★ [4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2：朝食後約30分						●	●	●