

レジメン名：患者限定)CBDCA+PTX+Nivolumab+Ipilimumab(1コース6週間) レジメンコード：301-1-1

レジメン期間：42日

診療科：呼吸器内科

がん種：免疫療法(非小細胞肺癌)

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG)	1 V	点滴注射 30分	●							
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆オプジーボ点滴静注 ※インラインフィルターを使用	1 V 360 mg /body	点滴注射 30分	●							
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) 2回目以降、問題なければフラッシュ可	1 V	点滴注射 30分	●							
004 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆ヤーボイ点滴静注 ※インラインフィルターを使用	1 V 1 mg/kg	点滴注射 30分	●							
005 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●							
006 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロヘトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(70キ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ボララミン注 5mg/1mL ガスター注 20mg/2mL	1 V 1 V 3 A 1 A 1 A	点滴注射 30分	●							
007 注射	生理食塩液注 500mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用	1 V 200 mg/m ²	点滴注射 180分	●							
008 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分	●							
009 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●							
010 前投	[125]アプレタカセル125mg「サリ」(イメド) 投開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り	●							
011 前投	[80]アプレタカセル80mg「サリ」(イメド) 午前中 2日目から服用	1 C	分1：朝食後約30分		●	●					
012 前投	★[4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2：朝食後約30分		●	●	●				
013 注射	生理食塩液注 100mL (PG)	1 V	点滴注射 30分					●			
014 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆オプジーボ点滴静注 ※インラインフィルターを使用	1 V 360 mg /body	点滴注射 30分					●			
015 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射					●			
016 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロヘトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(70キ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ボララミン注 5mg/1mL ガスター注 20mg/2mL	1 V 1 V 3 A 1 A 1 A	点滴注射 30分					●			
017 注射	生理食塩液注 500mL ◆パクリタキセル注	1 V 200 mg/m ²	点滴注射 180分					●			
018 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分					●			
019 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射					●			
020 前投	[125]アプレタカセル125mg「サリ」(イメド) 投開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り					●			

レジメン名：患者限定)CBDCA+PTX+Nivolumab+Ipilimumab(1コース6週間) レジメンコード：301-1-1

レジメン期間：42日

診療科：呼吸器内科

がん種：免疫療法(非小細胞肺癌)

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25
021 前投	[80]アブ°レ°カトカ°セル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1：朝食後約30分						●	●	
022 前投	★ [4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2：朝昼食後約30分						●	●	●