

レジメン名 : GDDP+PEM+Osimertinib short hydration(1コース3週間) レジメンコード : 344-1-1

レジメン期間 : 21日

診療科 : 呼吸器内科

がん種 : 非小細胞肺癌

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	ソルデム1 500mL ★アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット 【Mg】硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	1 袋 1 筒 1 A	点滴注射 60分	●			
002 注射	大塚生食注 50mL (PG) パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキソ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 15分	●			
003 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ベメトレキセド注射用	1 V 500 mg/m ²	点滴注射 10分	●			
004 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	点滴注射 30分	●			
005 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 75 mg/m ²	点滴注射 60分	●			
006 注射	ソルデム1 500mL ★アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット	1 袋 1 筒	点滴注射 60分	●			
007 前投	[125]アプレタントカプセル125mg「サワイ」(イメント) 投与開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●			
008 前投	[80]アプレタントカプセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	
009 前投	★[4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2 : 朝昼食後約30分		●	●	●
【レジメンコメント】 オシメルチニブ錠はNEC電子カルテから処方。							