

レジメン名：CBDCA+GEM+Pembrolizumab(1コ-33週間) レジメンコード：351-1-1
レジメン期間： 21日 診療科：呼吸器内科
がん種：免疫療法（非小細胞肺がん）

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハ°ロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイレ」(アロキシ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●				
002 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●				
003 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆キイトルーダ点滴静注 ※インラインフィルターを使用	1 V 200 mg / body	点滴注射 30分	●				
004 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●				
005 注射	5%ブドウ糖注 100mL ◆ゲムシタビン注射用	1 V 1000 mg / m ²	点滴注射 30分	●				
006 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分	●				
007 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●				
008 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 2 A	点滴注射 30分					●
009 注射	5%ブドウ糖注 100mL ◆ゲムシタビン注射用	1 V 1000 mg / m ²	点滴注射 30分					●
010 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射					●
011 前投	[125]ア°レ°タントカ°セル125mg「サワイ」(イメント°)	1 C	分1：医師の指示通り	●				
012 前投	[80]ア°レ°タントカ°セル80mg「サワイ」(イメント°) 妊開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：朝食後		●	●		
013 前投	★[4] デカドロン錠 4mg 午前中 2日目から服用	2 錠	分2：朝昼食後		●	●	●	