

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) パロチロン静注0.75mg/5mL「タイウ」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカドロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●			
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ペメトレキセド注射用	1 V 500 mg/m ²	点滴注射 10分	●			
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●			
004 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	点滴注射 60分	●			
005 注射	アセリオ静注液1000mgバッグ ボララミン注 5mg / 1mL	1 袋 1 A	点滴注射 15分	●			
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●			
007 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ライブリバント点滴静注 インラインフィルター要	1 V 1750 mg /body	点滴注射 120分	●			
008 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●			
009 前投	[125]77レビタントカプセル125mg「サワイ」(イメント) ※開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り	●			
010 前投	[80]77レビタントカプセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1：朝食後		●	●	
011 前投	★[4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2：朝昼食後		●	●	●

【レジメンコメント】
 パンセタン1g/日アリタ点滴7日前～・メチコパール2A/回アリタ点滴7日前～9週毎、最終投与後22日まで