レジメン名：CBDCA+PEM+Amivantamab(2ｺｰｽ目)(体重80kg以上)(1ｺｰｽ3週間)　非小細胞肺がん　レジメンコード：357-2-2

レジメン期間：　21日　　診療科：呼吸器内科

がん種：非小細胞肺がん

Rp	薬品/ｺﾒﾝﾄ	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注　１００ｍＬ（ＰＧ） ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎｳ」(ｱﾛｷｼ) ★デキサート注　3.3mg/1mL（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	１ Ｖ １ Ｖ ３ Ａ	点滴注射 30分	●			
002 注射	生理食塩液注　１００ｍＬ（ＰＧ） ◆ペメトレキセド注射用	１ Ｖ 500 ｍｇ/㎡	点滴注射 10分	●			
003 注射	大塚生食注　５０ｍＬ（ＰＧ） ﾌﾗｯｼｭ	１ Ｖ	点滴注射	●			
004 注射	５％ブドウ糖注　２５０ｍＬ ◆カルボプラチン点滴静注液	１ 袋 ５ AUC	点滴注射 60分	●			
005 注射	アセリオ静注液1000mgバッグ ポララミン注　５ｍｇ／１ｍＬ	１ 袋 １ Ａ	点滴注射 15分	●			
006 注射	大塚生食注　５０ｍＬ（ＰＧ） ﾌﾗｯｼｭ	１ Ｖ	点滴注射	●			
007 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ライブリバント点滴静注 ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ要	１ Ｖ 1750 ｍｇ /body	点滴注射 120分	●			
008 注射	大塚生食注　５０ｍＬ（ＰＧ）	１ Ｖ	点滴注射	●			
009 前投	[125]ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ125mg「ｻﾜｲ」(ｲﾒﾝﾄﾞ) ｹﾓ開始時【外来は処置として使用】	１ Ｃ	分１：医師の指示通り	●			
010 前投	[80]ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ80mg「ｻﾜｲ」(ｲﾒﾝﾄ) 午前中 2日目から服用	１ Ｃ	分１：朝食後		●	●	
011 前投	★［４］デカドロン錠　４mg	２ 錠	分２：朝昼食後		●	●	●

【レジメンコメント】
ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ1g/日ｱﾘﾑﾀ点滴7日前～・ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ2A/回ｱﾘﾑﾀ点滴7日前～9週毎、最終投与後22日まで