

レジメン名 : EP療法 (VP-16+CDDP) (1コース4週間) NEC レジメンコード : 246-1-1

レジメン期間 : 28日

診療科 : 消化器内科

がん種 : 消化器神経内分泌腫瘍

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキソ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカドロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●			
002 注射	5%ブドウ糖注 500mL ◆エトボシド点滴静注液	1 袋 100 mg/m ²	点滴注射 1時間	●			
003 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 120分	●			
004 注射	マンニトールS注 300mL	1 瓶	点滴注射 30分	●			
005 注射	生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 80 mg/m ²	点滴注射 120分	●			
006 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 120分	●			
007 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 120分	●			
008 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 120分		●	●	
009 注射	5%ブドウ糖注 500mL ◆エトボシド点滴静注液	1 袋 100 mg/m ²	点滴注射 1時間		●	●	
010 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 120分		●	●	
011 前投	[125]アプレタトカセル125mg「サワイ」(イメント) ※アプレチン投与60分前【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●			
012 前投	[80]アプレタトカセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	
013 前投	★[4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2 : 朝食後約30分		●	●	●
【レジメンコメント】 生食100mL/デキサート注2A・30分でも可							