

レジメン名：術前EC(EPI+CPA)+Pembrolizumab(1コ-3週間) レジメンコード：326-1-1

レジメン期間：14～21日 診療科：乳腺外科
がん種：乳がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハ°ロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイネ」(アロキソ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●			
002 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●			
003 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆キイトルーダ点滴静注 インラインフィルター使用	1 V 200 mg /body	点滴注射 30分	●			
004 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●			
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆エピルビシン インラインフィルター使用可	1 V 90 mg/m ²	点滴注射 15分	●			
006 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆注射用エンドキサン	1 V 600 mg/m ²	点滴注射 30分	●			
007 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●			
008 前投	[125]ア°レ°タ°カ°セル125mg「サワイ」(イメント°) 抗がん剤投与60分前に服用【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り	●			
009 前投	[80]ア°レ°タ°カ°セル80mg「サワイ」(イメント°) 午前中	1 C	分1：朝食後約30分		●	●	
010 前投	★[4] デカドロン錠 4mg 2日目から服用	2 錠	分2：朝食後約30分		●	●	●