

レジメン名 : CBDCA+GEM(外来)(1コース4週間) 尿路上皮癌(腎障害) レジメンコード : 140-1-2

レジメン期間 : 28日

診療科 : 泌尿器科

がん種 : 尿路上皮がん

| Rp        | 薬品/コメント   | 投与量                               | 用法/手技<br>点滴時間(速度) | Day<br>1 | Day<br>2 | Day<br>3 | Day<br>4 | Day<br>5 | Day<br>8 | Day<br>15 |
|-----------|---|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 001<br>注射 | 生理食塩液注 100mL (PG)<br>★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)                                  | 1 V<br>2 A                        | 点滴注射<br>30分       | ●        |          |          |          |          | ●        | ●         |
| 002<br>注射 | 5%ブドウ糖注 100mL<br>◆ジェムザール注射用   | 1 V<br>1000 mg/<br>m <sup>2</sup> | 点滴注射<br>30分       | ●        |          |          |          |          | ●        | ●         |
| 003<br>注射 | 大塚生食注 50mL (PG)<br>フラッシュ  | 1 V                               | 点滴注射              | ●        |          |          |          |          | ●        | ●         |
| 004<br>注射 | 生理食塩液注 100mL (PG)<br>パロメトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキ)<br>★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)  | 1 V<br>1 V<br>3 A                 | 点滴注射<br>30分       |          | ●        |          |          |          |          |           |
| 005<br>注射 | 5%ブドウ糖注 250mL<br>◆カルボプラチン点滴静注液  | 1 袋<br>5 AUC                      | 点滴注射<br>60分       |          | ●        |          |          |          |          |           |
| 006<br>注射 | 大塚生食注 50mL (PG)<br>フラッシュ  | 1 V                               | 点滴注射              |          | ●        |          |          |          |          |           |
| 007<br>前投 | [125]アプレタカセル125mg「サワイ」(イメント)<br>カルボプラチン投与1時間前【外来は処置として使用】<br>午前中<br>午前中 2日目から服用 | 1 C                               | 分1 : 医師の指示通り      |          | ●        |          |          |          |          |           |
| 008<br>前投 | [80]アプレタカセル80mg「サワイ」(イメント)<br>カルボプラチンの翌日から服用                                    | 1 C                               | 分1 : 朝食後約30分      |          |          | ●        | ●        |          |          |           |
| 009<br>前投 | ★[4]デカドロン錠 4mg<br>カルボプラチンの翌日から服用  | 2 錠                               | 分2 : 朝食後約30分      |          |          | ●        | ●        | ●        |          |           |