

レジメン名 : CBDCA+GEM(入院→外来)(1コース4週間) 尿路上皮癌(腎障害) レジメンコード : 140-1-3

レジメン期間 : 28日 診療科 : 泌尿器科
がん種 : 尿路上皮がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液注 500mL ルート確保、終了まで持続	1 V	点滴注射	●						
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 2 A	点滴注射 30分	●						
003 注射	5%ブドウ糖注 100mL ◆ジェムザール注射用	1 V 1000 mg / m ²	点滴注射 30分	●						
004 注射	生理食塩液注 500mL ルート確保、終了まで持続	1 V	点滴注射		●					
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイレ」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分		●					
006 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	点滴注射 60分		●					
007 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 2 A	点滴注射 30分						●	●
008 注射	5%ブドウ糖注 100mL ◆ジェムザール注射用	1 V 1000 mg / m ²	点滴注射 30分						●	●
009 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射						●	●
010 前投	[125]アブ・レ・タトカフセル125mg「サワイ」(イメント) カルボプラチン投与1時間前【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り		●					
011 前投	[80]アブ・レ・タトカフセル80mg「サワイ」(イメント) カルボプラチンの翌日から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分			●	●			
012 前投	★[4]デカドロン錠 4mg カルボプラチンの翌日から服用	2 錠	分2 : 朝食後約30分			●	●	●		