

レジメン名 : M-VAC (MTX+VLB+DXR+CDDP) (MTX:Day1, 15, 22投与) (1コース4週間) レジメンコード : 87-1-2

レジメン期間 : 28日

診療科 : 泌尿器科

がん種 : 尿路上皮がん

| Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 用法/手技 点滴時間(速度) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 15 | Day 22 |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 001 注射 | 生理食塩液注 500mL | 1 V | 点滴注射 2時間 | ● | | | | | ● | ● |
| 002 注射 | ソルテム3A 500mL メイロン静注8.4% 20mL | 1 袋 1 A | 点滴注射 2時間 | ● | | | | | ● | ● |
| 003 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ◆注射用メソトレキセート | 1 V 30 mg/m ² | 点滴注射 60分 | ● | | | | | ● | ● |
| 004 注射 | 生理食塩液注 500mL | 1 V | 点滴注射 4時間 | | ● | | | | | |
| 005 注射 | 【3G】ヴィーン3G注 500mL | 1 袋 | 点滴注射 4時間 | | ● | | | | | |
| 006 注射 | 生理食塩液注 500mL | 1 V | 点滴注射 4時間 | | ● | | | | | |
| 007 注射 | 【3G】ヴィーン3G注 500mL | 1 袋 | 点滴注射 4時間 | | ● | | | | | |
| 008 注射 | 生理食塩液注 500mL | 1 V | 点滴注射 4時間 | | ● | | | | | |
| 009 注射 | 【3G】ヴィーン3G注 500mL | 1 袋 | 点滴注射 4時間 | | ● | | | | | |
| 010 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ハロセトロン静注0.75mg/5mL「タイル」(アロキソ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカドロン) | 1 V 1 V 3 A | 点滴注射 30分 | | ● | | | | | |
| 011 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) ◆エクザール注射用 | 1 V 3 mg/m ² | 点滴注射 5分 | | ● | | | | | |
| 012 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ◆アドリアシン注用 | 1 V 30 mg/m ² | 点滴注射 30分 | | ● | | | | | |
| 013 注射 | マンニトールS注300mL | 1 瓶 | 点滴注射 30分 | | ● | | | | | |
| 014 注射 | 生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注 | 1 V 70 mg/m ² | 点滴注射 120分 | | ● | | | | | |
| 015 注射 | ソリューゲンG注(ヴァインD)500mL | 1 V | 点滴注射 6時間 | | | ● | | | | |
| 016 注射 | 【3G】ヴィーン3G注 500mL | 1 袋 | 点滴注射 6時間 | | | ● | | | | |
| 017 注射 | ソリューゲンG注(ヴァインD)500mL | 1 V | 点滴注射 6時間 | | | ● | | | | |
| 018 注射 | 【3G】ヴィーン3G注 500mL | 1 袋 | 点滴注射 6時間 | | | ● | | | | |
| 019 前投 | [125]アプレタントカプセル125mg「サワイ」(イメント) シスプラチン投与60分前【外来は処置として使用】 | 1 C | 分1 : 医師の指示通り | | ● | | | | | |
| 020 前投 | [80]アプレタントカプセル80mg「サワイ」(イメント) シスプラチンの翌日から服用 | 1 C | 分1 : 朝食後約30分 | | | ● | ● | | | |
| 021 前投 | ★[4] デカドロン錠 4mg シスプラチンの翌日から服用 | 2 錠 | 分2 : 朝食後約30分 | | | ● | ● | ● | | |