

レジメン名 : GC (GEM+CDDP) (入院) (1コース4週間) レジメンコード : 99-1-1

レジメン期間 : 28日

診療科 : 泌尿器科

がん種 : 尿路上皮がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 6時間	●					●	●
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 2 A	点滴注射 30分	●					●	●
003 注射	5%ブドウ糖注 100mL ◆ジェムザール注射用	1 V 1000 mg/ m ²	点滴注射 30分	●					●	●
004 注射	ソルデム3A 500mL	1 袋	点滴注射 6時間	●					●	●
005 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 6時間		●					
006 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ハロメトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(70キ)	1 V 3 A 1 V	点滴注射 30分		●					
007 注射	マンニトールS注 300mL	1 瓶	点滴注射 30分		●					
008 注射	生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 70 mg/m ²	点滴注射 120分		●					
009 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間		●					
010 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間		●					
011 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間		●					
012 前投	[125]77°レビタントカセル125mg「サワイ」(イメント) シスプラチン投与60分前【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り		●					
013 前投	[80]77°レビタントカセル80mg「サワイ」(イメント) シスプラチンの翌日から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分			●	●			
014 前投	★[4]デカドロン錠 4mg シスプラチンの翌日から服用	2 錠	分2 : 朝昼食後約30分			●	●	●		