

レジメン名 : GC (GEM+DDP) (外来) (1コース4週間) レジメンコード : 99-3-1

レジメン期間 : 28日

診療科 : 泌尿器科

がん種 : 尿路上皮がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 2 A	点滴注射 30分	●					●	●
002 注射	5%ブドウ糖注 100mL ◆ジェムザール注射用	1 V 1000 mg/ m <sup>2</sup>	点滴注射 30分	●					●	●
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ用	1 V	点滴注射	●					●	●
004 注射	ソルデム1 500mL ★アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット 【Mg】硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	1 袋 1 筒 1 A	点滴注射 60分		●					
005 注射	大塚生食注 50mL (PG) ハロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 15分		●					
006 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	点滴注射 30分		●					
007 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 70 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 60分		●					
008 注射	ソルデム1 500mL ★アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット	1 袋 1 筒	点滴注射 60分		●					
009 前投	[125]アプレタトカセル125mg「サワイ」(イメント) シスプラチン投与60分前【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り		●					
010 前投	[80]アプレタトカセル80mg「サワイ」(イメント) シスプラチンの翌日から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分			●	●			
011 前投	★[4]デカドロン錠 4mg シスプラチンの翌日から服用	2 錠	分2 : 朝食後約30分			●	●	●		