

レジメン名 : AI療法(DXR+IFM)(Day1-5投与)(1コース4週間) 悪性軟部腫瘍 レジメンコード : 106-1-2

レジメン期間 : 28日

診療科 : 泌尿器科

がん種 : 軟部組織悪性腫瘍

| Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 用法/手技 点滴時間(速度) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 001 注射 | ソルデム1 500mL メイロン静注8.4% 20mL | 1袋 1A | 点滴注射 6時間 | ● | ● | | | |
| 002 注射 | ソルデム3A 500mL メイロン静注8.4% 20mL | 1袋 1A | 点滴注射 6時間 | ● | ● | | | |
| 003 注射 | ソルデム1 500mL メイロン静注8.4% 20mL | 1袋 1A | 点滴注射 6時間 | ● | ● | | | |
| 004 注射 | ソルデム3A 500mL メイロン静注8.4% 20mL | 1袋 1A | 点滴注射 6時間 | ● | ● | | | |
| 005 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) グラニセトロン静注用 1mg/1mL ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) | 1V 1A 3A | 点滴注射 30分 | ● | ● | | | |
| 006 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆アドリアシン注用 | 1V 30 mg/m ² | 点滴注射 2時間 | ● | ● | | | |
| 007 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) [要]ウロミテキサン注 400mg/4mL 休マド 投与前 | 1V 400 mg/m ² | 点滴注射 30分 | ● | ● | | | |
| 008 注射 | 生理食塩液注 500mL ◆注射用イホマイド | 1V 2 g/m ² | 点滴注射 4時間 | ● | ● | | | |
| 009 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) [要]ウロミテキサン注 400mg/4mL 休マド 投与時から4時間後 | 1V 400 mg/m ² | 点滴注射 30分 | ● | ● | | | |
| 010 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) [要]ウロミテキサン注 400mg/4mL 休マド 投与時から8時間後 | 1V 400 mg/m ² | 点滴注射 30分 | ● | ● | | | |
| 011 注射 | ソルデム1 500mL メイロン静注8.4% 20mL | 1袋 1A | 点滴注射 6時間 | | | ● | ● | ● |
| 012 注射 | ソルデム3A 500mL メイロン静注8.4% 20mL | 1袋 1A | 点滴注射 6時間 | | | ● | ● | ● |
| 013 注射 | ソルデム1 500mL メイロン静注8.4% 20mL | 1袋 1A | 点滴注射 6時間 | | | ● | ● | ● |
| 014 注射 | ソルデム3A 500mL メイロン静注8.4% 20mL | 1袋 1A | 点滴注射 6時間 | | | ● | ● | ● |
| 015 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) グラニセトロン静注用 1mg/1mL ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) | 1V 1A 3A | 点滴注射 30分 | | | ● | ● | ● |
| 016 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) [要]ウロミテキサン注 400mg/4mL 休マド 投与前 | 1V 400 mg/m ² | 点滴注射 30分 | | | ● | ● | ● |
| 017 注射 | 生理食塩液注 500mL ◆注射用イホマイド | 1V 2 g/m ² | 点滴注射 4時間 | | | ● | ● | ● |
| 018 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) [要]ウロミテキサン注 400mg/4mL 休マド 投与時から4時間後 | 1V 400 mg/m ² | 点滴注射 30分 | | | ● | ● | ● |
| 019 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) [要]ウロミテキサン注 400mg/4mL 休マド 投与時から8時間後 | 1V 400 mg/m ² | 点滴注射 30分 | | | ● | ● | ● |