

FEC (5-FU + EPI + CPA) 21-1-1

乳腺外科

レジメン期間：21日

| Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 |
|-----------|---|------------------------------|------------------|------|------|------|------|
| 001 注射 | 生理食塩液100mL パロノセトロン塩酸塩注 0.75mg/5mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL | 1 V 1 V 3 A | 点滴注射 | ○ | | | |
| 002 注射 | 生理食塩液50mL エピルビシン 全開(前投薬終了までにエピルビシン投与を終了) | 1 V 75 mg/m ² | 点滴注射 | ○ | | | |
| 003 注射 | 生理食塩液250mL シクロホスファミド注 | 1 V 500 mg/m ² | 投与時間：30分 点滴注射 | ○ | | | |
| 004 注射 | 生理食塩液100mL 5-FU注 全開 | 1 V 500 mg/m ² | 点滴注射 | ○ | | | |
| 005 注射 | 生理食塩液50mL フラッシュ | 1 V | 点滴注射 | ○ | | | |
| 006 前投 | アプレピタントカプセル125mg 点滴開始60分前に内服 | 1 C | 分1：医師の指示通り | ○ | | | |
| 007 処方 | アプレピタントカプセル80mg 午前中 | 1 C | 分1：医師の指示通り | | ○ | ○ | |
| 008 処方 | デキサメタゾン錠4mg | 2 錠 | 分2：朝昼食後約30分 | | ○ | ○ | ○ |