

R-CHOP 187-1-1

血液内科・臨床腫瘍科

レジメン期間：14～21日 最大コース数：8

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
001 注射	ソルデム1 500mL ルート確保	1 袋	点滴注射	○					
002 注射	生理食塩液 リツキシマブ注	500mL 375 mg/m ²	点滴注射	○					
003 注射	ソルデム1 500mL ルート確保	1 袋	点滴注射		○				
004 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL	1 V 1 A	投与時間：30分 点滴注射		○				
005 注射	生理食塩液100mL ドキソルビシン注	1 V 50 mg/m ²	投与時間：30分 点滴注射		○				
006 注射	生理食塩液50mL ビンクリスチン注	1 V 1.4 mg/m ²	投与時間：5分 点滴注射		○				
007 注射	生理食塩液500mL シクロホスファミド注	1 V 750 mg/m ²	投与時間：2時間 点滴注射		○				
008 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射		○				
009 前投	アセトアミノフェン錠200mg リツキシマブ投与30分前	2 錠	分1：医師の指示通り	○					
010 前投	ヒドロキシジン塩酸塩カプセル25mg リツキシマブ投与30分前	1 C	分1：医師の指示通り	○					
011 処方	プレドニゾン錠5mg	12 錠	分1：朝食後約30分		○	○	○	○	○
012 処方	プレドニゾン錠5mg	8 錠	分1：昼食後約30分		○	○	○	○	○
【レジメンコメント】									
初回：50mL/hで開始し30分毎に50mL/hずつUP (MAX400mL/h)、2回目以降問題なければ：100mL/hで開始し30分毎に100mL/hずつUP (MAX400mL/h)									