

mFOLFOX6 23-1-1  
 外科，消化器内科  
 レジメン期間：14日

| Rp        | 薬品/コメント                                            | 投与量                          | 投与時間・用法/手技        | Day1 |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------|
| 001<br>注射 | 生理食塩液100mL<br>グラニセトロン注1mg/1mL<br>デキサメタゾン注3.3mg/1mL | 1 V<br>1 A<br>3 A            | 投与時間：30分<br>点滴注射  | ○    |
| 002<br>注射 | 5%ブドウ糖注250mL<br>オキサリプラチン注<br>レボホリナートと同時            | 1 袋<br>85 mg/m <sup>2</sup>  | 投与時間：2時間<br>点滴注射  | ○    |
| 003<br>注射 | 5%ブドウ糖注250mL<br>レボホリナートカルシウム注<br>オキサリプラチンと同時       | 1 袋<br>200 mg/m <sup>2</sup> | 投与時間：2時間<br>点滴注射  | ○    |
| 004<br>注射 | 生理食塩液50mL<br>5-FU注<br>全開                           | 1 V<br>400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴注射              | ○    |
| 005<br>注射 | 生理食塩液<br>5-FU注<br>46時間持続                           | 2400 mg/m <sup>2</sup>       | 投与時間：46時間<br>持続注入 | ○    |