

## mFOLFOX6+Nivolumab 313-1-1

消化器内科、外科

レジメン期間：14日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1
001 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射	○
002 注射	生理食塩液100mL ニボルマブ注 インラインフィルター使用	1 V 240 mg/body	投与時間：30分 点滴注射	○
003 注射	5%ブドウ糖注250mL オキサリプラチン注 レボホリナートと同時	1 袋 85 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：2時間 点滴注射	○
004 注射	5%ブドウ糖注250mL レボホリナートカルシウム注 オキサリプラチンと同時	1 袋 200 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：2時間 点滴注射	○
005 注射	生理食塩液50mL 5-FU注 全開	1 V 400 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	○
006 注射	生理食塩液50mL	1 V	点滴注射	○
007 注射	生理食塩液 5-FU注 46時間持続	2400 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：46時間 持続注入	○