

## CBDCA + PEM + Pembrolizumab 264-1-1

## 呼吸器内科

レジメン期間：21日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4
001 注射	生理食塩液100mL グラニセトン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射	○			
002 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○			
003 注射	生理食塩液100mL ペムブロリズマブ注	1 V 200 mg/body	投与時間：30分 点滴注射	○			
004 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○			
005 注射	生理食塩液100mL ペメトレキセド注	1 V 500 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：10分 点滴注射	○			
006 注射	生理食塩液100mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○			
007 注射	5%ブドウ糖注250mL カルボプラチン注	1 袋 5 AUC	投与時間：1時間 点滴注射	○			
008 注射	生理食塩液50mL 全開 フラッシュ	1 V	点滴注射	○			
009 前投	アプレピタントカプセル125mg 点滴開始60分前	1 C	分1：医師の指示通り	○			
010 処方	アプレピタントカプセル80mg 午前中	1 C	分1：医師の指示通り		○	○	
011 処方	デキサメタゾン錠4mg	2 錠	分2：朝食後約30分		○	○	○
【レジメンコメント】							
パニピタン1g/日アムタ点滴7日前～・メチコパル2A/回アムタ点滴7日前～9週毎、最終投与後22日まで							