

CBDCA + PEM 110-1-1

呼吸器内科

レジメン期間：21日

| Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 |
|--|--|------------------------------|------------------|------|------|------|------|
| 001 注射 | 生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL | 1 V 1 A 3 A | 投与時間：30分 点滴注射 | ○ | | | |
| 002 注射 | 生理食塩液100mL ペメトレキセド注 | 1 V 500 mg/m ² | 投与時間：10分 点滴注射 | ○ | | | |
| 003 注射 | 生理食塩液100mL | 1 V | 投与時間：30分 点滴注射 | ○ | | | |
| 004 注射 | 5%ブドウ糖注250mL カルボプラチン注 | 1 袋 5 AUC | 投与時間：1時間 点滴注射 | ○ | | | |
| 005 注射 | 生理食塩液50mL 全開 フラッシュ | 1 V | 点滴注射 | ○ | | | |
| 006 前投 | アプレピタントカプセル125mg ケモ開始時 | 1 C | 分1：医師の指示通り | ○ | | | |
| 007 処方 | アプレピタントカプセル80mg 午前中 2日目から服用 | 1 C | 分1：医師の指示通り | | ○ | ○ | |
| 008 処方 | デキサメタゾン錠4mg | 2 錠 | 分2：朝昼食後約30分 | | ○ | ○ | ○ |
| 【レジメンコメント】 パンプタン1g/日アリム点滴7日前～・マチコパール2A/回アリム点滴7日前～9週毎、最終投与後22日まで | | | | | | | |