

FOLFIRI + Cetuximab (1コース目) 104-1-1

外科 消化器内科

レジメン期間：14日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day8
001 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL	1 V 1 A 3 A 1 A	投与時間：30分 点滴注射	○	
002 注射	生理食塩液500mL セツキシマブ注	1V 400 mg/m ²	投与時間：2時間 点滴注射	○	
003 注射	生理食塩液250mL フラッシュ、セツキシマブの投与速度と同じで、フラッシュ後ライン確保用	1 V	投与時間：1時間 点滴注射	○	
004 注射	生理食塩液250mL イリノテカン注 レボホリナートと同時	1 V 150 mg/m ²	投与時間：2時間 点滴注射	○	
005 注射	5%ブドウ糖注250mL レボホリナートカルシウム注 イリノテカンと同時	1 袋 200 mg/m ²	投与時間：2時間 点滴注射	○	
006 注射	生理食塩液50mL 5-FU注 全開	1 V 400 mg/m ²	点滴注射	○	
007 注射	生理食塩液 5-FU注 46時間持続	2400 mg/m ²	投与時間：46時間 持続注入	○	
008 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL	1 V 2 A 1 A	投与時間：30分 点滴注射		○
009 注射	生理食塩液250mL セツキシマブ注	1V 250 mg/m ²	投与時間：1時間 点滴注射		○
010 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	投与時間：5分 点滴注射		○