

## FOLFIRI + RAM 244-1-1

外科 消化器内科

レジメン期間：14日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1
001 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL	1 V 1 A 3 A 1 A	投与時間：30分 点滴注射	○
002 注射	生理食塩液250mL ラムシルマブ注	1 V 8 mg/kg	投与時間：1時間 点滴注射	○
003 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○
004 注射	生理食塩液250mL イリノテカン注 レボホリナート同時	1 V 150 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：2時間 点滴注射	○
005 注射	5%ブドウ糖注250mL レボホリナートカルシウム注 カプトト同時	1 袋 200 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：2時間 点滴注射	○
006 注射	生理食塩液50mL 5-FU注 全開	1 V 400 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	○
007 注射	生理食塩液 5-FU注 46時間持続	2400 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：46時間 持続注入	○