

IRIS + BV 211-1-1

外科、消化器内科

レジメン期間：28日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	~	Day14	Day15
001 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射	○			
002 注射	生理食塩液100mL ベバシズマブ注 初回90分、2回目60分、3回目以降30分可	1 V 5 mg/kg	投与時間：1時間30分 点滴注射	○			
003 注射	生理食塩液250mL イリノテカン注	1 V 100 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：1時間30分 点滴注射	○			
004 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○			
005 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射				○
006 注射	生理食塩液100mL ベバシズマブ注 初回90分、2回目60分、3回目以降30分可	1 V 5 mg/kg	投与時間：1時間30分 点滴注射				○
007 注射	生理食塩液250mL イリノテカン注	1 V 100 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：1時間30分 点滴注射				○
008 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射				○
009 処方	エスワン錠 服用開始日は夕方から	80mg/m <sup>2</sup>	分2：朝夕食後約30分	○	~	○	