

IRIS + Cetuximab (1コ-1目) 192-1-1

外科, 消化器内科

レジメン期間: 28日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	~	Day8	~	Day14	Day15	Day22
001 注射	生理食塩液100mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 1 A 3 A	投与時間: 30分 点滴注射	○						
002 注射	生理食塩液500mL セツキシマブ注 初回120分	1V 400 mg/m ²	投与時間: 2時間 点滴注射	○						
003 注射	生理食塩液250mL セツキシマブと同じ速度で	1 V	投与時間: 1時間 点滴注射	○						
004 注射	生理食塩液250mL イリノテカン注	1 V 100 mg/m ²	投与時間: 1時間30分 点滴注射	○						
005 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○						
006 注射	生理食塩液100mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 2 A	投与時間: 30分 点滴注射			○				○
007 注射	生理食塩液250mL セツキシマブ注	1V 250 mg/m ²	投与時間: 1時間 点滴注射			○				○
008 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	投与時間: 5分 点滴注射			○				○
009 注射	生理食塩液100mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 1 A 3 A	投与時間: 30分 点滴注射						○	
010 注射	生理食塩液250mL セツキシマブ注	1V 250 mg/m ²	投与時間: 1時間 点滴注射						○	
011 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	投与時間: 5分 点滴注射						○	
012 注射	生理食塩液250mL イリノテカン注	1 V 100 mg/m ²	投与時間: 1時間30分 点滴注射						○	
013 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射						○	
014 処方	エスワン錠 服用開始日は夕方から	80mg/m ²	分2: 朝夕食後約30分	○	~	○	~	○		