

IRIS + Cetuximab (2コース目以降) 192-1-2

外科 消化器内科

レジメン期間：28日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	～	Day8	～	Day14	Day15	Day22
001 注射	生理食塩液100mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射	○					○	
002 注射	生理食塩液250mL セツキシマブ注	1V 250 mg/m ²	投与時間：1時間 点滴注射	○					○	
003 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	投与時間：5分 点滴注射	○					○	
004 注射	生理食塩液250mL イリノテカン注	1 V 100 mg/m ²	投与時間：1時間30分 点滴注射	○					○	
005 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○					○	
006 注射	生理食塩液100mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 2 A	投与時間：30分 点滴注射			○				○
007 注射	生理食塩液250mL セツキシマブ注	1V 250 mg/m ²	投与時間：1時間 点滴注射			○				○
008 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	投与時間：5分 点滴注射			○				○
009 処方	エスワン錠 服用開始日は夕方から	80mg/m ²	分2：朝夕食後約30分	○	～	○	～	○		