

SP (S-1 + CDDP) + Trastuzumab short hydration (2コース以降) (3週間) 232-2-2

外科 消化器内科

レジメン期間：21日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4	~	Day14
001 注射	生理食塩液50mL パロノセトロン塩酸塩注 0.75mg/5mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 V 3 A	投与時間：15分 点滴注射	○					
002 注射	生理食塩液250mL トラスツズマブ注	1 V 6 mg/kg	投与時間：30分 点滴注射	○					
003 注射	ソルデム1 500mL アスパラギン酸カリウム注10mEq 硫酸マグネシウム液1mEq/mL 20mL	1 袋 1 筒 1 A	投与時間：1時間 点滴注射	○					
004 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	投与時間：30分 点滴注射	○					
005 注射	生食250mL シスプラチン注	1 V 60 mg/m ²	投与時間：1時間 点滴注射	○					
006 注射	ソルデム1 500mL アスパラギン酸カリウム注10mEq	1 袋 1 筒	投与時間：1時間 点滴注射	○					
007 前投	アプレピタントカプセル125mg 化学療法開始時	1 C	分1：医師の指示通り	○					
008 処方	アプレピタントカプセル80mg 午前中	1 C	分1：医師の指示通り		○	○			
009 処方	デキサメタゾン錠4mg	2 錠	分2：朝昼食後約30分		○	○	○		
010 処方	エスワン錠 服用開始日は夕方から	80mg/m ²	分2：朝夕食後約30分	○	○	○	○	~	○