

FOLFIRINOX 210-1-1

外科 消化器内科

レジメン期間：14日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4
001 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射	○			
002 注射	5%ブドウ糖注250mL オキサリプラチン注	1 袋 85 mg/m ²	投与時間：2時間 点滴注射	○			
003 注射	5%ブドウ糖注250mL レボホリナートカルシウム注 リ/リカと同時	1 袋 200 mg/m ²	投与時間：2時間 点滴注射	○			
004 注射	生理食塩液250mL イリノテカン注 レホリナートと同時	1 V 180 mg/m ²	投与時間：2時間 点滴注射	○			
005 注射	生理食塩液50mL 5-FU注 全開	1 V 400 mg/m ²	点滴注射	○			
006 注射	生理食塩液 5-FU注 46時間持続	2400 mg/m ²	投与時間：46時間 持続注入	○			
007 前投	アプレピタントカプセル125mg 点滴開始60分前	1 C	分 1	○			
008 処方	アプレピタントカプセル80mg 午前中	1 C	分 1		○	○	
009 処方	デキサメタゾン錠4mg	2 錠	分 2：朝昼食後約30分		○	○	○