

CBDCA + GEM (入院→外来) 140-1-3

泌尿器科

レジメン期間：28日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4	Day8	Day15
001 注射	ソリューゲンF注(ゲイ-ンF)500mL ルート確保、終了まで持続	1 V	点滴注射	○					
002 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 2 A	投与時間：30分 点滴注射	○					
003 注射	5%ブドウ糖注100mL ゲムシタビン注	1 V 1000 mg/m ²	投与時間：30分 点滴注射	○					
004 注射	ソリューゲンF注(ゲイ-ンF)500mL ルート確保、終了まで持続	1 V	点滴注射		○				
005 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 1.5 A	投与時間：30分 点滴注射		○				
006 注射	5%ブドウ糖注250mL カルボプラチン注	1 袋 5 AUC	投与時間：1時間 点滴注射		○				
007 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 2 A	投与時間：30分 点滴注射					○	○
008 注射	5%ブドウ糖注100mL ゲムシタビン注	1 V 1000 mg/m ²	投与時間：30分 点滴注射					○	○
009 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射					○	○
010 前投	アプレピタントカプセル125mg カルボプラチン投与60分前	1 C	分1：医師の指示通り		○				
011 処方	アプレピタントカプセル80mg 午前中	1 C	分1：医師の指示通り			○	○		
012 処方	デキサメタゾン錠4mg	1 錠	分1：朝食後約30分			○	○		