

GC (GEM + CDDP) (入院→外来) 99-2-1

泌尿器科

レジメン期間：28日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day8	Day15
001 注射	ソリューゲンF注(ゲンF)500mL	1 V	投与時間：6時間 点滴注射	○						
002 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 2 A	投与時間：30分 点滴注射	○						
003 注射	5%ブドウ糖注100mL ゲムシタビン注	1 V 1000 mg/m ²	投与時間：30分 点滴注射	○						
004 注射	ソルデム3A 500mL	1 袋	投与時間：6時間 点滴注射	○						
005 注射	ソリューゲンF注(ゲンF)500mL	1 V	投与時間：6時間 点滴注射		○					
006 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL グラニセトロン注1mg/1mL	1 V 3 A 1 A	投与時間：30分 点滴注射		○					
007 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	投与時間：30分 点滴注射		○					
008 注射	生理食塩液500mL シスプラチン注	1 V 70 mg/m ²	投与時間：2時間 点滴注射		○					
009 注射	ヴィーン3G注 500mL	1 袋	投与時間：6時間 点滴注射		○					
010 注射	ヴィーン3G注 500mL	1 袋	投与時間：6時間 点滴注射		○					
011 注射	ヴィーン3G注 500mL	1 袋	投与時間：6時間 点滴注射		○					
012 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 2 A	投与時間：30分 点滴注射						○	○
013 注射	5%ブドウ糖注100mL ゲムシタビン注	1 V 1000 mg/m ²	投与時間：30分 点滴注射						○	○
014 注射	生理食塩液50mL フラッシュ用	1 V	点滴注射						○	○
015 前投	アプレピタントカプセル125mg シスプラチン投与60分前	1 C	分1：医師の指示通り		○					
016 処方	アプレピタントカプセル80mg 午前中	1 C	分1：医師の指示通り			○	○			
017 処方	デキサメタゾン錠4mg	2 錠	分2：朝食後約30分			○	○	○		