

Conventional TC (PTX + CBDCA) 76-1-1

産婦人科

レジメン期間：21日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4
001 注射	ソルデム3A 500mL ルート確保 妊娠終了まで持続	1 袋	点滴注射	○			
002 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL ガスター注 20mg/2mL ポララミン注 5mg / 1mL	1 V 5 A 1 A 1 A	投与時間：30分 点滴注射	○			
003 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL	1 V 1 A	投与時間：30分 点滴注射	○			
004 注射	生理食塩液500mL パクリタキセル注	1 V 175 mg / m ²	投与時間：3時間 点滴注射	○			
005 注射	5%ブドウ糖注250mL カルボプラチン注	1 袋 5 AUC	投与時間：1時間 点滴注射	○			
006 前投	アプレピタントカプセル125mg 点滴開始60分前	1 C	分1：医師の指示通り	○			
007 処方	アプレピタントカプセル80mg 午前中	1 C	分1：医師の指示通り		○	○	
008 処方	デキサメタゾン錠4mg	2 錠	分2：朝昼食後約30分		○	○	○
【レジメンコメント】 アルコール過敏注意							