AP (DXR + CDDP) 252-1-1 <u>産婦人科</u> レジメン期間:21日

Rp	薬品/1ペレ	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4
001 注射	ソルデム1 500mL ★アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット 硫酸マグネシウム液1mEq/mL 20mL	1 袋 1 筒 1 A	点滴注射	0			
002 注射	生理食塩液50mL パロノセトロン塩酸塩注 0.75mg/5mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 V 3 A	投与時間:30分 点滴注射	0			
003 注射	生理食塩液50mL ドキソルビシン注	1 V 60 mg/m²	投与時間:15分 点滴注射	0			
004 注射	マンニットールS注300mL	1 瓶	投与時間:30分 点滴注射	0			
	生食250mL シスプラチン注	1 V 50 mg/m²	投与時間:1時間 点滴注射	0			
006 注射	ソルデム1 500mL ★アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット	1 袋 1 筒	投与時間:1時間 点滴注射	0			
	アプレピタントカプセル125mg 点滴開始60分前	1 C	分1:医師の指示通り	0			
008 処方	アプレピタントカプセル80mg 午前中	1 C	分1:医師の指示通り		0	0	
009 処方	デキサメタゾン錠4mg	2 錠	分2:朝昼食後約30分		0	0	0