

レジメン名 : TC (PTX+CBDCA) +BV (3回目以降) (1コ-3週間) レジメンコード : 233-1-3

レジメン期間 : 21日 診療科 : 産婦人科
がん種 : 卵巣がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注 500mL ルート確保 妊終了まで持続	1 V	点滴注射	●			
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デ'カト'ロン) ガスター注 20mg/2mL ポラミン注 5mg/1mL パ'ロ'セト'ロ'ン静注0.75mg/5mL「タイ林」(ア'ロ'キ'ン)	1 V 5 A 1 A 1 A 1 V	点滴注射 30分	●			
003 注射	生理食塩液注 500mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下)	1 V 175 mg/m ²	点滴注射 3時間	●			
004 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分	●			
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆アバスチン点滴静注用 3回目以降30分可	1 V 15 mg/kg	点滴注射 30分	●			
006 前投	[125]ア'ラ'ビ'タ'ント'カ'セル125mg「サ'イ」(イ'メ'ト) 化学療法時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●			
007 前投	[80]ア'ラ'ビ'タ'ント'カ'セル80mg「サ'イ」(イ'メ'ト) 午前中	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	
008 前投	★ [4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2 : 朝昼食後約30分		●	●	●
【レジメンコメント】 アルコール過敏注意							