

レジメン名 : Dose-dense TC(weekly PTX+CBDCA) (1コース4週間) レジメンコード : 77-1-1

レジメン期間 : 28日 診療科 : 産婦人科
がん種 : 卵巣がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15
001 注射	ソルデム3A 500mL ルート確保 妊終了まで持続	1 袋	点滴注射	●					
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ガスター注 20mg/2mL ポラミン注 5mg/1mL パロメトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキ)	1 V 3 A 1 A 1 A 1 V	点滴注射 30分	●					
003 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下)	1 V 70 mg/m ²	点滴注射 60分	●					
004 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分	●					
005 注射	ソルデム3A 500mL ルート確保 妊終了まで持続	1 袋	点滴注射					●	●
006 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ガスター注 20mg/2mL ポラミン注 5mg/1mL	1 V 2 A 1 A 1 A	点滴注射 30分					●	●
007 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下)	1 V 70 mg/m ²	点滴注射 60分					●	●
008 前投	[125]アブシラチンカプセル125mg「サイ」(イメント) 化学療法時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●					
009 前投	[80]アブシラチンカプセル80mg「サイ」(イメント) 午前中	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●			
010 前投	★[4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2 : 朝食後約30分		●	●	●		
【レジメンコメント】 アルコール過敏注意									