

レジメン名 : weekly TC(ip 腹腔内投与)(PTX+CBDCA)(1コース4週間) 卵巣癌 レジメンコード : 92-1-1

レジメン期間 : 28日 診療科 : 産婦人科
がん種 : 卵巣がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	ソルデム3A 500mL ルート確保 終了まで持続	1 袋	点滴注射	●		
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ガスター注 20mg/2mL ポラミン注 5mg/1mL	1 V 3 A 1 A 1 A	点滴注射 30分	●		
003 注射	生理食塩液注 100mL (PG) パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイレク」(アキシ)	1 V 1 V	点滴注射 30分	●		
004 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下)	1 V 70 mg/m ²	点滴注射 60分	●		
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG)	1 V	腹腔内注射	●		
006 注射	5%ブドウ糖注 500mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	腹腔内注射 120分	●		
007 注射	ソルデム3A 500mL ルート確保 終了まで持続	1 袋	点滴注射		●	●
008 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ガスター注 20mg/2mL ポラミン注 5mg/1mL	1 V 2 A 1 A 1 A	点滴注射 30分		●	●
009 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下)	1 V 70 mg/m ²	点滴注射 60分		●	●
【レジメンコメント】 アルコール過敏注意 CBDCA : 5%TZやNS 0.5~1Lに混注、又は別々に、2~3時間かけて腹腔内投与						