レジメン名：XP(Capecitabine+CDDP)+HER(1ｺｰｽ目)(1ｺｰｽ3週間)胃癌　レジメンコード：152-1-1
レジメン期間： 21日　　診療科：消化器内科／外科
がん種：胃がん

Rp	薬品/ｺﾒﾝﾄ	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14
001 注射	【３Ｇ】ヴィーン３Ｇ注　500mL	1 袋	点滴注射 60分	●													
002 注射	【３Ｇ】ヴィーン３Ｇ注　500mL	1 袋	点滴注射 60分	●													
003 注射	【３Ｇ】ヴィーン３Ｇ注　500mL	1 袋	点滴注射 60分	●													
004 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ハーセプチン注射用	1 Ｖ 8 ｍｇ/kg	点滴注射 90分	●													
005 注射	生理食塩液注　１００ｍＬ（ＰＧ） ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎｳ」(ｱﾛｷｼ) ★デキサート注　3.3mg/1mL（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 Ｖ 1 Ｖ 3 Ａ	点滴注射 30分	●													
006 注射	マンニットールＳ注３００mL	1 瓶	点滴注射 30分	●													
007 注射	生理食塩液注　５００ｍＬ ◆シスプラチン点滴静注	1 Ｖ 80 ｍｇ/㎡	点滴注射 120分	●													
008 注射	生理食塩液注　５００ｍＬ	1 Ｖ	点滴注射 120分	●													
009 注射	【３Ｇ】ヴィーン３Ｇ注　500mL	1 袋	点滴注射 60分	●													
010 注射	【３Ｇ】ヴィーン３Ｇ注　500mL	1 袋	点滴注射 60分	●													
011 前投	[125]ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ125mg「ｻﾜｲ」(ｲﾒﾝﾄﾞ) 化学療法開始時【外来は処置として使用】	1 Ｃ	分１：医師の指示通り	●													
012 前投	[80]ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ80mg「ｻﾜｲ」(ｲﾒﾝﾄ) 午前中　2日目から服用	1 Ｃ	分１：朝食後約３０分		●	●											
013 前投	★［４］デカドロン錠　４mg	2 錠	分２：朝昼食後約３０分		●	●	●										
014 処方	ゼローダ錠 0㎡　～　2400ｍｇ 1.36㎡　～　3000ｍｇ 1.66㎡　～　3600ｍｇ 1.96㎡　～　4200ｍｇ 服用開始日は夕方から	2400 ｍｇ /body	分２：朝夕食後約３０分	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□