レジメン名：SP(S-1+CDDP)+HER short hydration(1ｺｰｽ目)(3週間)胃癌　レジメンコード：232-2-1
レジメン期間： 21日　　診療科：消化器内科／外科
がん種：胃がん

Rp	薬品/ｺﾒﾝﾄ	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14
001 注射	大塚生食注　５０ｍＬ（ＰＧ） ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL｢ﾀｲﾎｳ｣(ｱﾛｷｼ) ★デキサート注　3.3mg/1mL（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	１ Ｖ １ Ｖ ３ Ａ	点滴注射 15分	●													
002 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ハーセプチン注射用	１ Ｖ ８ ｍｇ/kg	点滴注射 90分	●													
003 注射	ソルデム１　５００mL ★アスパラギン酸ｶﾘｳﾑ注 10mEqｷｯﾄ 【Mg】硫酸Ｍｇ補正液1mEq/mL 20mL	１ 袋 １ 筒 １ Ａ	点滴注射 60分	●													
004 注射	マンニットールＳ注３００mL	１ 瓶	点滴注射 30分	●													
005 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆シスプラチン点滴静注	１ Ｖ 60 ｍｇ/㎡	点滴注射 60分	●													
006 注射	ソルデム１　５００mL ★アスパラギン酸ｶﾘｳﾑ注 10mEqｷｯﾄ	１ 袋 １ 筒	点滴注射 60分	●													
007 前投	[125]ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ125mg｢ｻﾜｲ｣(ｲﾒﾝﾄﾞ) 化学療法開始時【外来は処置として使用】	１ Ｃ	分１：医師の指示通り	●													
008 前投	[80]ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ80mg｢ｻﾜｲ｣(ｲﾒﾝﾄ) 午前中　2日目から服用	１ Ｃ	分１：朝食後約３０分		●	●											
009 前投	★［４］デカドロン錠　４mg	２ 錠	分２：朝昼食後約３０分		●	●	●										
010 処方	エスワンＯＤ錠 0㎡　～　80ｍｇ 1.25㎡　～　100ｍｇ 1.5㎡　～　120ｍｇ 服用開始日は夕方から	80 ｍｇ /body	分２：朝夕食後約３０分	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□