

レジメン名 : XELOX+Zolbetuximab(1コース目)(1コース3週間) レジメンコード : 343-1-1

レジメン期間 : 21日 診療科 : 消化器内科/外科

がん種 : 胃がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセトロン静注0.75mg/5mL「タイレク」(アロキソ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ポララミン注 5mg/1mL アロカリス点滴静注235mg	1 V 1 V 3 A 1 A 1 V	点滴注射 30分	●													
002 注射	溶解液(自動計算) 輸液(自動計算) ◆ビロイ注  インラインフィルター使用。	自動 自動 800 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	●													
003 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆エルブラット注射用	1 袋 130 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 120分	●													
004 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●													
005 処方	ゼローダ錠 0m <sup>2</sup> ~ 2400mg 1.36m <sup>2</sup> ~ 3000mg 1.66m <sup>2</sup> ~ 3600mg 1.96m <sup>2</sup> ~ 4200mg  服用開始日は夕方から	2400 mg /body	分2 : 朝夕食後約30分	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
006 前投	★[4] デカドロン錠 4mg 午前中 2日前から服用	2 錠	分2 : 朝昼食後約30分		●	●	●										
【レジメンコメント】 ビロイ注の投与速度は指示コメントを参照。指示なければ主治医へ確認。																	