

レジメン名 : mFOLF0X6+Zolbetuximab (1コース目) (1コース2週間) レジメンコード : 346-1-1

レジメン期間 : 14日 診療科 : 消化器内科/外科

がん種 : 胃がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロヘト静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカドロン) ポララミン注 5mg/1mL アロカリス点滴静注235mg	1 V 1 V 3 A 1 A 1 V	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 30分	●			
002 注射	溶解液(自動計算) 輸液(自動計算) ◆ビロイ注 インラインフィルター使用。	自動 自動 800 mg/m ²	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続)	●			
003 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆エルブラット注射用 ルホリナートと同時	1 袋 85 mg/m ²	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分	●			
004 注射	5%ブドウ糖注 250mL レボホリナート点滴静注用 エルブラットと同時	1 袋 200 mg/m ²	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続) 120分	●			
005 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆5-FU注 全開	1 V 400 mg/m ²	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続)	●			
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	中心静脈栄養(埋込 型・精密持続)	●			
007 注射	輸液(自動計算) ◆5-FU注(インフューザーホップ) 46時間持続。クソム確認。	自動 2400 mg/ m ²	腫瘍剤静脈内局所持続 注入(精密・速度指示 46時間)	●			
008 前投	★[4] デカドロン錠 4mg 午前中 2日目から服用	2 錠	分2 : 朝食後約30 分		●	●	●
【レジメンコメント】 インフューザーホップのクソムを確認! ビロイ注の投与速度は指示コメントを参照。指示コメントがない場合は主治医へ 確認。							